

Impfkalender

Staupe, Parvovirose ("Katzenseuche"), Ansteckende Leberentzündung, Leptospirose, Tollwut. Unter Umständen kann auch die Impfung gegen **Zwingerhusten** ratsam sein.

Die **Grundimmunisierung** wird üblicherweise im Alter von 8 Lebenswochen begonnen, gegen Staupe und Parvovirose gibt es Impfungen, die bei großer Infektionsgefahr bereits in der 6. Lebenswoche verwendet werden können. Die erste Tollwutimpfung hingegen sollte nicht vor der 12. Lebenswoche verabreicht werden. Für eine vollständige Grundimmunisierung ist eine Nachimpfung aller Komponenten mit ca. 12, gegen Tollwut mit 16 Wochen erforderlich. Gegen Parvovirose sind u.U. mehrere Nachimpfungen im Abstand von 2-4 Wochen bis zu einem Alter von 12 bis 16 Wochen durchzuführen (je nach verwendetem Impfstoff unterschiedlich). Bei den meisten Impfstoffen ist eine zeitliche Trennung der Verabreichung verschiedener Komponenten (vor allem Parvovirose und Staupe) bei der Grundimmunisierung empfehlenswert, weil dadurch eine bessere Immunantwort erwartet werden kann.

Einen allgemein gültigen Impfplan gibt es nicht!
Ihr Tierarzt erstellt ihn individuell für Ihr Tier oder Ihren Bestand.
Richtlinien für die Grundimmunisierung bei Welpen:

1. Impfung Folgeimpfungen

Staupe/Leberentz. Leptospirose 8 Wochen
(gegen Staupe ev. 6 Wochen)
12 Wochen

Parvovirose 6.-8. Woche u.U. alle 2-4 Wochen
bis 12.-16. Woche

Tollwut ab 12 Wochen ca. 4 Wochen später

Zwingerhusten 8 Wochen

Vorbedingungen für Impfung

Es dürfen nur klinisch gesunde Tiere geimpft werden.

Ihr Tierarzt kontrolliert den Gesundheitszustand Ihres Tieres anlässlich der Impfung.

Auch ein eventuell vorhandener Parasitenbefall muss unbedingt vorher beseitigt werden! Ihr Hund sollte daher ca. 14 Tage vor der Impfung entwurmt werden.

Katze

Gegen die folgenden gefährlichen Virusinfektionen der Katze sind Impfungen möglich und empfehlenswert:

Panleukopenie, Katzenleukose, Katzenschnupfen, Tollwut. Unter Umständen kann auch die Impfung gegen **Feline Infektiöse Peritonitis (FIP)** bei Katzen, die nicht latent infiziert sind, ratsam sein.

Die **Grundimmunisierung** wird üblicherweise im Alter von 9 Lebenswochen begonnen, die erste Tollwutimpfung sollte nicht vor der 12. Lebenswoche verabreicht werden. Für eine vollständige Grundimmunisierung ist eine Nachimpfung aller Komponenten mit ca. 12, gegen Tollwut mit 16 Wochen erforderlich. Eine zeitliche Trennung der Verabreichung der Panleukopenie- und der Katzenleukose - Impfstoffe bei der Grundimmunisierung ist empfehlenswert, weil dadurch eine bessere Immunantwort erwartet werden kann.

Einen allgemein gültigen Impfplan gibt es nicht!
Ihr Tierarzt erstellt ihn individuell für Ihr Tier oder Ihren Bestand.
Richtlinien für die Grundimmunisierung bei Welpen:

1. Impfung Folgeimpfungen

Panleukopenie ca. 9 Wochen 12 Wochen,
ev. nochmals 16 Wochen

Katzenschnupfen ca. 9 Wochen 12 Wochen

Katzenleukose ab 9. Woche 2-4 Wochen später

Tollwut ab 12. Woche ca. 4 Wochen später

Vorbedingungen für Impfung:

Es dürfen nur klinisch gesunde Tiere geimpft werden.

Ihr Tierarzt kontrolliert den Gesundheitszustand Ihres Tieres anlässlich der Impfung.

Auch ein eventuell vorhandener Parasitenbefall muss unbedingt vorher beseitigt werden Ihre Katze sollte daher ca. 14 Tage vor der Impfung entwurmt werden.